Laore

Agentzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

BAMSar

Bollettino Agro-Meteo della Sardegna

Bollettino n. 14 del 2026

Periodo validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026

Area B

ZONA DI VIGILANZA ARPAS - Campidano

Campidano di Cagliari - Medio Campidano - Parteolla - Trexenta - Bassa Marmilla

Indice Colture

AGRUMI

OLIVO

CARCIOFO

FINOCCHIO

LATTUGA

AGRUMI

Fasi fenologiche

Invaiatura o rottura del colore del frutto



Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Mosca della frutta - AGRUMI

Scelta fitosanitaria	Alta pressione dell'avversità
Livello rischio	MEDIO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Le varietà in fase di invaiatura sono maggiormente recettive alla mosca. Al fine di abbassare la popolazione del fitofago si consiglia l'installazione di trappole di cattura massale in numero di 80 -100 per Ha e l'uso di esche proteiche avvelenate.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Acetamiprid	4A	NT	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Attract and kill con: Deltametrina			

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Attract and kill con: Lambda-cialotrina			

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

(da usare combinati)			
Cyantraniliprole	28	NT	
Esche proteiche			

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Esche proteiche			
Spinosad	5	NT	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Attract and kill con: Esfenvalerate			

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Arancio Varietà precoci

Scelta fitosanitaria	Alta pressione dell'avversità
Livello rischio	ALTO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche	Al fine di abbassare la popolazione del fitofago si consiglia l'installazione di trappole di cattura massale in numero di 80 -100 per Ha e l'uso di esche proteiche avvelenate.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Attract and kill con: Deltametrina			

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Acetamiprid	4A	NT	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Attract and kill con: Lambda-cialotrina			

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Cyantraniliprole	28	NT	

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Esche proteiche			

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Esche proteiche			
Spinosad	5	NT	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Lambda-cialotrina	3A	PIR	

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Clementine Varietà precoci

Scelta fitosanitaria	Alta pressione dell'avversità
Livello rischio	ALTO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche	Al fine di abbassare la popolazione del fitofago si consiglia l'installazione di trappole di cattura massale in numero di 80 -100 per Ha e l'uso di esche proteiche avvelenate.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Acetamiprid	4A	NT	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Attract and kill con: Deltametrina			

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Attract and kill con: Lambda-cialotrina			

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Cyantraniliprole	28	NT	

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Esche proteiche			

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Esche proteiche			
Spinosad	5	NT	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Lambda-cialotrina	3A	PIR	

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

CARCIOFO

Fasi fenologiche

Comparsa capolino 1°

Copertura del terreno < 50%



Pratiche agronomiche	• Razionalizzare gli interventi irrigui e le concimazioni azotate

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Afide del carciofo

Scelta fitosanitaria	Effettuare monitoraggio aziendale: Raggiunta soglia di intervento
Livello rischio	DA VALUTARE in azienda
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Osservare la pagina inferiore delle foglie, intervenire in caso di significativa presenza di afidi, preferibilmente concentrare il trattamento sui primi focolai.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Acetamiprid	4A	NT	

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Chiocciole e limacce sul carciofo

Scelta fitosanitaria	Effettuare monitoraggio aziendale: Sintomi visibili
Livello rischio	DA VALUTARE in azienda
Scelta fitoiatrica	Intervento Consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Intervenire nelle fasce perimetrali, circoscrivere il campo con calce per evitare la migrazione da zone esterne.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Fosfato ferrico			

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Metaldeide esca			

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Nottue fogliari su carciofo

Scelta fitosanitaria	Bassa pressione dell'avversità
Livello rischio	DA VALUTARE in azienda
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Intervenire tempestivamente in caso di presenza di larve, in particolare nei carciofeti con i capolini in formazione.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bacillus thuringiensis	11A	CEI	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Clorantraniliprole	28	NT	
Lambda-cialotrina	3A	PIR	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Emamectina benzoato	6	NT	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Spinosad	5	NT	

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Oidio del carciofo

Scelta fitosanitaria	Condizioni ambientali favorevoli
Livello rischio	MEDIO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Dai controlli in campo non si rilevano infezioni significative, ma essendo le previsioni meteo favorevoli si consiglia di tenere protetta la carciofaia.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Azoxystrobin	11	C3	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Tebuconazolo	3	G1	

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Peronospora su carciofo

Scelta fitosanitaria	Condizioni ambientali favorevoli
Livello rischio	BASSO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Nel recente monitoraggio non sono state rilevate infezioni, tuttavia è consigliato intervenire preventivamente in quanto le condizioni ambientali sono favorevoli. Fare attenzione al periodo di carenza dei principi attivi utilizzati.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Fosetil-Al	P07	P	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Azoxystrobin	11	C3	

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

FINOCCHIO

Fasi fenologiche

Pre-trapianto

Grumolo completamente formato e compatto



Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

coltura: FINOCCHIO

Elateridi su finocchio

Scelta fitosanitaria	Effettuare monitoraggio aziendale: Raggiunta soglia di intervento
Livello rischio	DA VALUTARE in azienda
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Trattare al trapianto se è stata rilevata la presenza degli elateridi sui cicli precedenti o mediante trappole alimentari opportunamente posizionate.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Teflutrin	3A	PIR	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Lambda-cialotrina	3A	PIR	

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Limacce su finocchio

Scelta fitosanitaria	Alta pressione dell'avversità
Livello rischio	DA VALUTARE in azienda
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Intervenire solo dove sussiste il problema, a partire dalle fasce perimetrali, circoscrivere il campo con calce per evitare la migrazione da zone esterne.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Ortofosfato di ferro			

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Moria delle piantine del finocchio

Scelta fitosanitaria	Condizioni ambientali favorevoli
Livello rischio	ALTO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Adottare ampi avvicendamenti, utilizzare sementi certificate. In vivaio è consigliato trattare il substrato di semina con prodotti microbiologici. In campo consigliati trattamenti preventivi in particolare nelle prime fasi.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Trichoderma asperellum	BM02	BM	
Trichoderma spp.	BM02	BM	

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Ramularia del finocchio

Scelta fitosanitaria	Bassa pressione dell'avversità
Livello rischio	BASSO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Non sono state riscontrate le infezioni in campo, tuttavia si prevedono condizioni meteorologiche favorevoli per cui si consiglia un trattamento preventivo.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Difenoconazolo	3	G1	

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Rhizoctonia su finocchio

Scelta fitosanitaria	Condizioni ambientali favorevoli
Livello rischio	ALTO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Adottare ampi avvicendamenti, utilizzare sementi certificate. In vivaio è consigliato trattare il substrato di semina con prodotti microbiologici. In campo consigliati trattamenti preventivi in particolare nelle prime fasi.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Trichoderma asperellum	BM02	BM	
Trichoderma spp.	BM02	BM	

Bollettino Agrometeorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

LATTUGA

Fasi fenologiche

Sviluppo delle Parti Edibili / Chiusura Cespo

Marciume basale della lattuga

Scelta fitosanitaria	Condizioni ambientali favorevoli
Livello rischio	MEDIO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Le condizioni climatiche più favorevoli hanno incrementato le infezioni. Si consiglia di intervenire preventivamente in tutte le situazioni colturali, soprattutto poco prima della fase di chiusura del cespo. Alternare principi attivi diversi.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Coniothyrium minitans	BM02		

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Cyprodinil	9	D1	
Fludioxonil	12	E2	

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Difenoconazolo	3	G1	

Bollettino Agrometeorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Fluxapyroxad	7	C2	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Fenexamid	17	G3	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Trichoderma spp.	BM02	BM	

coltura: LATTUGA

Nottue fogliari su lattuga

Scelta fitosanitaria	Bassa pressione dell'avversità
Scelta fitoiatrica	Intervento NON consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Non si ritrovano più le nottue in campo, non consigliato trattamento insetticida.

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Peronospora della lattuga

Scelta fitosanitaria	Bassa pressione dell'avversità
Livello rischio	MEDIO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Consigliato l’impiego di varietà resistenti ai ceppi di Bremia più diffusi nella zona. Le condizioni ambientali sono favorevoli allo sviluppo delle infezioni, si consigliano pertanto interventi preventivi.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Cimoxanil	27	Sconosciuto	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Fluopicolide	43	B5	

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

coltura: LATTUGA

Tripide occidentale su lattuga

Scelta fitosanitaria	Bassa pressione dell'avversità
Scelta fitoiatrica	Intervento NON consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Non si osservano più tripidi in campo, non consigliato trattamento insetticida, sebbene il virus trasmesso è ancora presente.

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

OLIVO

Fasi fenologiche

Inizio invaiatura

Invaiatura



Pratiche agronomiche	• Quando possibile anticipare la raccolta

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Occhio di pavone

Scelta fitosanitaria	Bassa pressione dell'avversità
Livello rischio	DA VALUTARE in azienda
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	In post raccolta è consigliato un trattamento contro l'occhio di pavone al fine di tenere bassa l'infezione.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Prodotti rameici	M1	M	

Bollettino AgroMeteorologico n. 14 del 2026 Area B Validità: 30 ottobre - 05 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Link Utili

Arpa Sardegna

Portale regionale che offre accesso online a servizi amministrativi e pratiche digitali, semplificando i procedimenti e promuovendo trasparenza e digitalizzazione per cittadini, imprese e istituzioni.

Guida all'uso dei prodotti fitosanitari

Fornisce indicazioni per un impiego sicuro e responsabile dei fitosanitari, promuovendo la tutela della salute, dell'ambiente e la gestione sostenibile delle colture.

Controlli funzionali e regolazione delle macchine irroratrici

Disciplina le verifiche periodiche delle attrezzature per l'applicazione dei fitosanitari, assicurando efficienza, sicurezza e riduzione dell'impatto ambientale.

Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)

Certifica pratiche agricole sostenibili attraverso regole e controlli che limitano l'uso di prodotti fitosanitari e garantiscono qualità, sicurezza alimentare e tutela ambientale.

Disciplinari di Produzione Integrata Sardegna 2026

Definiscono le norme tecniche per una gestione agricola sostenibile, regolando fertilizzazione, difesa fitosanitaria e pratiche colturali per ridurre l'impatto ambientale e assicurare produzioni di qualità.

Legenda tipologia sostanze attive



Sostanze attive ammesse in Agricoltura Biologica



Sostanze attive ammesse in Produzione Integrata