Laore
Agentzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

BAMSar
Bollettino Agro-Meteo della Sardegna

Bollettino n. 17 del 2026

Periodo validità: 20 - 26 novembre 2026

Area B

ZONA DI VIGILANZA ARPAS - Campidano

Campidano di Cagliari - Medio Campidano - Parteolla - Trexenta - Bassa Marmilla

Indice Colture

AGRUMI

OLIVO

VITE

CARCIOFO

FINOCCHIO

LATTUGA

AGRUMI

Fasi fenologiche

Invaiatura o rottura del colore del frutto



Mosca della frutta - AGRUMI

Scelta fitosanitaria	Alta pressione dell'avversità
Livello rischio	ALTO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Le varietà in fase di invaiatura sono maggiormente recettive alla mosca. Al fine di abbassare la popolazione del fitofago si consiglia l'installazione di trappole di cattura massale in numero di 80 -100 per Ha e l'uso di esche proteiche avvelenate.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Acetamiprid	4A	NT	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Attract and kill con: Deltametrina			

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Attract and kill con: Lambda-cialotrina			

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato

Bollettino Agro-Meteorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

(da usare combinati)			
Cyantraniliprole	28	NT	
Esche proteiche			

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Esche proteiche			
Spinosad	5	NT	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Attract and kill con: Esfenvalerate			

Bollettino Agrometeorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Arancio Varietà precoci

Scelta fitosanitaria	Alta pressione dell'avversità
Livello rischio	ALTO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche	Al fine di abbassare la popolazione del fitofago si consiglia l'installazione di trappole di cattura massale in numero di 80 -100 per Ha e l'uso di esche proteiche avvelenate.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Attract and kill con: Deltametrina			

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Acetamiprid	4A	NT	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Attract and kill con: Lambda-cialotrina			

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Cyantraniliprole	28	NT	

Bollettino AgroMeteorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Esche proteiche			

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Esche proteiche			
Spinosad	5	NT	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Lambda-cialotrina	3A	PIR	

Clementine Varietà precoci

Scelta fitosanitaria	Alta pressione dell'avversità
Livello rischio	ALTO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche	Al fine di abbassare la popolazione del fitofago si consiglia l'installazione di trappole di cattura massale in numero di 80 -100 per Ha e l'uso di esche proteiche avvelenate.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Acetamiprid	4A	NT	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Attract and kill con: Deltametrina			

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Attract and kill con: Lambda-cialotrina			

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Cyantraniliprole	28	NT	

Bollettino Agrometeorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Esche proteiche			

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Esche proteiche			
Spinosad	5	NT	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Lambda-cialotrina	3A	PIR	

CARCIOFO

Fasi fenologiche

Comparsa capolini 2°

Copertura del terreno 50-80%



Pratiche agronomiche	• Razionalizzare gli interventi irrigui e le concimazioni azotate

Bollettino AgroMeteorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Afide del carciofo

Scelta fitosanitaria	Effettuare monitoraggio aziendale: Raggiunta soglia di intervento
Livello rischio	DA VALUTARE in azienda
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Osservare la pagina inferiore delle foglie, intervenire in caso di significativa presenza di afidi, preferibilmente concentrare il trattamento sui primi focolai. Attenzione al tempo di carenza.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Acetamiprid	4A	NT	

Bollettino Agrometeorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Chiocciole e limacce sul carciofo

Scelta fitosanitaria	Effettuare monitoraggio aziendale: Sintomi visibili
Livello rischio	DA VALUTARE in azienda
Scelta fitoiatrica	Intervento Consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Intervenire nelle fasce perimetrali, circoscrivere il campo con calce per evitare la migrazione da zone esterne. In abbinamento ai prodotti registrati sono utili sostanze repellenti autorizzate su carciofo per favorire l'allontanamento dalla pianta.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Fosfato ferrico			

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Metaldeide esca			

Bollettino Agrometeorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

coltura: CARCIOFO

Nottue fogliari su carciofo

Scelta fitosanitaria	Bassa pressione dell'avversità
Livello rischio	DA VALUTARE in azienda
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Intervenire tempestivamente in caso di presenza di larve, in particolare nei carciofeti con i capolini in formazione.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bacillus thuringiensis	11A	CEI	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Clorantraniliprole	28	NT	
Lambda-cialotrina	3A	PIR	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Emamectina benzoato	6	NT	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Spinosad	5	NT	

Bollettino AgroMeteorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Oidio del carciofo

Scelta fitosanitaria	Condizioni ambientali favorevoli
Livello rischio	BASSO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Non sono consigliati trattamenti, ma tenere sotto controllo i campi ed intervenire tempestivamente nei casi in cui si presentino i primi sintomi della malattia.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Pyraclostrobin	11	C3	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bicarbonato di potassio			

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Tetraconazolo	3	G1	

Bollettino Agrometeorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Peronospora su carciofo

Scelta fitosanitaria	Condizioni ambientali favorevoli
Livello rischio	MEDIO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Nel recente monitoraggio sono state rilevate le prime infezioni, è consigliato intervenire in quanto permangono condizioni favorevoli. Si possono utilizzare anche biofungicidi registrati per la Bremia a base Bacillus subtilis.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Fosetil-Al	P07	P	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Pyraclostrobin	11	C3	

Bollettino Agrometeorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

FINOCCHIO

Fasi fenologiche

Grumolo quasi a maturazione, dimensioni

Trapianto



Limacce su finocchio

Scelta fitosanitaria	Alta pressione dell'avversità
Livello rischio	DA VALUTARE in azienda
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Intervenire solo dove sussiste il problema, a partire dalle fasce perimetrali, circoscrivere il campo con calce per evitare la migrazione da zone esterne.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Ortofosfato di ferro			

Bollettino Agrometeorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Marciume molle batterico del finocchio

Scelta fitosanitaria	Bassa pressione dell'avversità
Livello rischio	MEDIO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Essendo le condizioni ambientali favorevoli intervenire preventivamente.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Prodotti rameici	M1	M	

Bollettino AgroMeteorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Ramularia del finocchio

Scelta fitosanitaria	Bassa pressione dell'avversità
Livello rischio	MEDIO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Sono state osservate le prime sporadiche infezioni, consigliato un trattamento preventivo.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Difenoconazolo	3	G1	

Bollettino AgroMeteorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Sclerotinia su finocchio

Scelta fitosanitaria	Bassa pressione dell'avversità
Livello rischio	MEDIO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Essendo le condizioni ambientali favorevoli intervenire preventivamente.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bacillus amyloliquefaciens	F6	BM02	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bacillus subtilis	F6		

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Coniothyrium minitans	BM02		

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Trichoderma spp.	BM02	BM	

Bollettino AgroMeteorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

LATTUGA

Fasi fenologiche

Sviluppo delle Parti Edibili / Chiusura Cespo

Marciume basale della lattuga

Scelta fitosanitaria	Condizioni ambientali favorevoli
Livello rischio	MEDIO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Le condizioni climatiche più favorevoli hanno incrementato le infezioni. Si consiglia di intervenire preventivamente in tutte le situazioni colturali, soprattutto poco prima della fase di chiusura del cespo. Alternare principi attivi diversi.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Coniothyrium minitans	BM02		

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Cyprodinil	9	D1	
Fludioxonil	12	E2	

Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Difenoconazolo	3	G1	

Bollettino AgroMeteorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Fluxapyroxad	7	C2	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Fenexamid	17	G3	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Trichoderma spp.	BM02	BM	

Bollettino AgroMeteorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Peronospora della lattuga

Scelta fitosanitaria	Bassa pressione dell'avversità
Livello rischio	MEDIO
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Consigliato l’impiego di varietà resistenti ai ceppi di Bremia più diffusi nella zona. Le condizioni ambientali sono favorevoli allo sviluppo delle infezioni, si consigliano pertanto interventi preventivi.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Cimoxanil	27	Sconosciuto	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Fluopicolide	43	B5	

Bollettino AgroMeteorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

OLIVO

Fasi fenologiche

Maturazione

Invaiatura



Occhio di pavone

Scelta fitosanitaria	Bassa pressione dell'avversità
Livello rischio	DA VALUTARE in azienda
Scelta fitoiatrica	Intervento consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	In post raccolta è consigliato un trattamento contro l'occhio di pavone al fine di tenere bassa l'infezione.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Prodotti rameici	M1	M	

Bollettino AgroMeteorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

VITE

Fasi fenologiche

Caduta foglie



Indicazioni Tecniche (generali coltura)	Cominciare le operazioni di potatura quando le piante hanno perso tutte le foglie.

Bollettino AgroMeteorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Mal dell'esca

Scelta fitosanitaria	Sintomi NON visibili
Scelta fitoiatrica	Intervento NON consigliato
Indicazioni tecniche (specifiche avversità)	Non esistono tecniche curative si può solo ricorrere a misure preventive. In questa fase consigliata l'estirpazione delle piante secche e fortemente deperite, poi allontanarle dal vigneto e bruciarle al fine di ridurre la fonte di inoculo.

Bollettino AgroMeteorologico n. 17 del 2026 Area B Validità: 20-26 novembre 2026 - Agenzia Laore Sardegna

Link Utili

Arpa Sardegna

Portale regionale che offre accesso online a servizi amministrativi e pratiche digitali, semplificando i procedimenti e promuovendo trasparenza e digitalizzazione per cittadini, imprese e istituzioni.

Guida all'uso dei prodotti fitosanitari

Fornisce indicazioni per un impiego sicuro e responsabile dei fitosanitari, promuovendo la tutela della salute, dell'ambiente e la gestione sostenibile delle colture.

Controlli funzionali e regolazione delle macchine irroratrici

Disciplina le verifiche periodiche delle attrezzature per l'applicazione dei fitosanitari, assicurando efficienza, sicurezza e riduzione dell'impatto ambientale.

Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)

Certifica pratiche agricole sostenibili attraverso regole e controlli che limitano l'uso di prodotti fitosanitari e garantiscono qualità, sicurezza alimentare e tutela ambientale.

Disciplinari di Produzione Integrata Sardegna 2026

Definiscono le norme tecniche per una gestione agricola sostenibile, regolando fertilizzazione, difesa fitosanitaria e pratiche colturali per ridurre l'impatto ambientale e assicurare produzioni di qualità.

Legenda tipologia sostanze attive



Sostanze attive ammesse in Agricoltura Biologica



Sostanze attive ammesse in Produzione Integrata