

# Laore

Agenzia regionale  
per lo sviluppo in agricoltura  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo in agricoltura



## Notiziario fitosanitario

N. 555/ATO8/2025

Valido dal 07/03 al 17/03/2025

Servizio **SMS**  
avvisi su infestazioni e  
trattamenti direttamente  
sul tuo cellulare  
[www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it) Info sul web

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla

Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 60268007

### Consigli culturali e difesa



#### Vite

Fase fenologica: Gemma in riposo invernale **scalaPFP A** **scalaBBCH 00**

Mal dell'esca (vari funghi tra cui Fomitiporia mediterranea, Phaemoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum): il complesso di crittogame che causano la malattia penetrano all'interno della pianta attraverso le ferite di potatura. Più queste sono ampie e più è facile che i funghi riescano a instaurarsi. Al momento si può intervenire esclusivamente in modo preventivo sia con funghi antagonisti come i Trycoderma oppure con alcune sostanze di sintesi capaci di colonizzare e disinfettare i tagli di potatura. Entrambi vanno somministrati possibilmente a gemma dormiente e non oltre le due settimane dalla fine della potatura. In ogni caso leggere attentamente le indicazioni in etichetta



#### Olivo

Fase fenologica: Ripresa vegetativa - germogliamento **scalaPFP 2 (B1 e B2)** **scalaBBCH 01-19**

Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina): si segnala che dai controlli in campo risultano i primi attacchi di occhio di pavone. Si consiglia, per chi non avesse provveduto ad effettuare i trattamenti invernali anticrittogamici, d'intervenire al più presto con prodotti di contatto quali: sali di Rame, zolfi bagnabili, Fosfonati di Potassio e Bacillus. Riservare, possibilmente, i prodotti endoterapici di sintesi al periodo di prefioritura. Controllare attentamente in etichetta le registrazioni sulla coltura e le modalità d'uso dei prodotti.

## **Pesco**

Fase fenologica: rigonfiamento gemme (pesco)

Bolla del pesco (*Taphrina deformans*): si consiglia d'intervenire al più presto su tutti i fruttiferi allo stadio di gemma rigonfia contro crittogame come Bolla, Corineo, Monilia, Ticchiolatura ecc.ecc . Si possono utilizzare sia prodotti di contatto che endoterapici. Evitare di effettuare trattamenti sulle specie e varietà in fioritura. Per ogni evenienza controllare in etichetta le registrazioni, il periodo d'intervento consigliato, i tempi di carenza ecc.