

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



Notiziario fitosanitario

N. 661/ATO8/2026

Valido dal 11/02 al 17/02/2026

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo cellulare
www.sardegnaagricoltura.it Info sul web

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla

Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 60268007

Consigli culturali e difesa



Vite

Fase fenologica: Gemma in riposo invernale

:per quanto riguarda la concimazione invernale, si consiglia d'intervenire con un concime ternario a basso titolo di azoto. Si possono utilizzare i classici ternari come 11-22-16 o 12-12-17 abbinandoli a un concime a base organica come i superstallatici pellettati (3-6 qli). Ci sono in commercio dei concimi ternari già abbinati a una percentuale più o meno variabile di sostanza organica che sono altrettanto efficaci. E' sempre auspicabile l'uso dei letami maturi o dei compost. Nei vigneti irrigui distribuire 3-4 qli ad Ha di ternario in una sola somministrazione invernale, oppure dividere in due il quantitativo, metà in inverno e il resto in primavera. Nei vigneti non irrigui intervenire solo in inverno con massimo 2-2,5 qli ad Ha. I letami e i compost vanno distribuiti il più presto possibile.



Olivo

Fase fenologica: Riposo vegetativo

:per quanto riguarda la concimazione invernale, si consiglia d'intervenire con un concime ternario a basso titolo di azoto. Si possono utilizzare i classici ternari come 11-22-16 o 12-12-17 abbinandoli a un concime a base organica come i superstallatici pellettati (3-6 qli). Ci sono in commercio dei concimi ternari già abbinati a una percentuale più o meno variabile di sostanza organica che sono altrettanto efficaci. E' sempre auspicabile l'uso dei letami maturi o dei compost. Negli oliveti irrigui distribuire 3-4 qli ad Ha di ternario in una sola somministrazione invernale, oppure dividere in due il quantitativo, metà in inverno e il resto in primavera. Negli oliveti non irrigui intervenire solo in inverno con massimo 2-2,5 qli ad Ha. I letami e i compost vanno distribuiti il più presto possibile.

Pesco

Fase fenologica: Gemma in riposo invernale (pesco)

:su tutti i fruttiferi, si consiglia d'intervenire con un concime ternario a basso titolo di azoto. Si possono utilizzare i classici ternari come 11-22-16 o 12-12-17 abbinandoli a un concime a base organica come i superstallatici pellettati (3-6 qli). Ci sono in commercio dei concimi ternari già abbinati a una percentuale più o meno variabile di sostanza organica che sono altrettanto efficaci. E' sempre auspicabile l'uso dei letami maturi o dei compost. Nei Frutteti distribuire 5-7 qli ad Ha di ternario in una sola somministrazione invernale, oppure dividere in due il quantitativo, metà in inverno e il resto in primavera. I letami e i compost vanno distribuiti il più presto possibile.



Agrumi

Fase fenologica: Maturazione

Allupatura (Phytophthora spp.): a causa dell'umidità relativa molto elevata, dovuta alle continue piogge, si stanno verificando fenomeni di allupatura dei frutti causati da agenti fungini come *Phytophthora* spp. e attacchi di muffe del genere *Penicillium* spp. (muffe azzurre e verdi) che provocano la cascola e la perdita di percentuali variabili dei frutti. Si consiglia di provvedere alla raccolta dei frutti il più in fretta possibile, visto che continueranno a persistere le piogge e perciò le condizioni ideali per l'attacco delle Crittogame.

Per quanto riguarda la concimazione invernale, si consiglia d'intervenire con un concime ternario a basso titolo di azoto. Si possono utilizzare i classici ternari come 11-22-16 o 12-12-17 abbinandoli a un concime a base organica come i superstallatici pellettati (3-6 qli). Ci sono in commercio dei concimi ternari già abbinati a una percentuale più o meno variabile di sostanza organica che sono altrettanto efficaci. Negli agrumeti distribuire 6-8 qli ad Ha di ternario frazionandoli in 2-3 somministrazioni a partire dal tardo autunno e finendo nella tarda primavera.

