

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



Notiziario fitosanitario

N. 702/ATO8/2026

Valido dal 02/07 al 10/07/2026

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo **cellulare**
www.sardegnaagricoltura.it Info sul web

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla

Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 60268007

Consigli culturali e difesa



Vite

Fase fenologica: Chiusura grappolo scalaPFP -- scalaBBCH 77

Oidio o Mal Bianco (Erisiphe (=Uncinula) necator): al momento si riscontra solo qualche focolaio su varietà altamente sensibili. Considerando che per i prossimi giorni è previsto un momentaneo abbassamento delle temperature con venti di maestrale e il verificarsi di qualche temporale pomeridiano, si consiglia di tenere sempre sotto controllo i vigneti, poiché si potrebbero verificare nuovi attacchi da parte della crittogama. A partire dal fine settimana le temperature saranno di nuovo in forte aumento, perciò valutare attentamente l'uso degli zolfi soprattutto nel Parteolla dove le temperature potranno salire di nuovo di oltre 4-5° rispetto alle medie del periodo. In alternativa agli Zolfi si possono utilizzare prodotti di origine biologica a base di bacilli antagonisti, oli essenziali, Bicarbonati, Strobilurine e prodotti con alta affinità alle cere del grappolo. In ogni caso verificare in etichetta la compatibilità fra i vari principi attivi

Peronospora (Plasmopara viticola): malgrado l'abbassarsi delle temperature e il verificarsi di qualche rovescio pomeridiano, è probabile che a causa del ritorno dell'alta pressione africana e conseguente innalzamento delle temperature, l'attività del fungo si blocchi completamente. Se si optasse per un intervento su varietà altamente sensibili è consigliabile l'uso di rame a dosaggio estivo, abbinato ad un prodotto altamente affini alle cere del grappolo..

Tignoletta della vite (Lobesia botrana): Cryptoblabes Gnidiella: le catture al momento, nelle stazioni di monitoraggio, risultano prossime allo zero, ci troviamo in una fase interlocutoria tra la seconda e la terza generazione. Diverso è il discorso su uva da tavole, dove le generazioni tendono ad accavallarsi, perciò tenere costantemente sotto controllo la popolazione con monitoraggi continui ed intervenire al superamento della soglia d'intervento. (1-2% dei grappoli con uova o larve attive)



Olivo

Fase fenologica: Indurimento nocciolo scalaPFP 6 (F) scalaBBCH 75

Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): al momento le catture nelle stazioni di monitoraggio risultano nulle e dal controllo delle drupe non risultano presenti ovodeposizioni da parte del fitofago. Nel parteolla, a partire dal giorno di sabato (nuovo rialzo termico), le temperature impediranno la deposizione da parte delle femmine e probabilmente anche la morte degli adulti. Anche nelle zone costiere le temperature saranno abbastanza elevate 33-35° gradi e perciò con un buon controllo della mosca. In ogni caso è sempre consigliato monitorare costantemente le drupe.



Agrumi

Fase fenologica: Ingrossamento frutti (agrumi)

Aleurodidi agrumi (*Aleurotixus floccosus*, *Dialeurodes citri*): si riscontrano i primi attacchi di diverse specie di aleurodidi. Monitorare costantemente la vegetazione e in presenza dei fitofagi intervenire con lavaggi a base di detergenti potassici registrati per l'uso in agricoltura, alternandoli con acidi grassi di sali potassici o con prodotti di sintesi selettivi nei confronti degli insetti utili.

Pesco

Fase fenologica: maturazione di raccolta (drupacee)

Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*): si riscontrano i primi attacchi da parte dell'insetto. Intervenire su tutte le specie e varietà in maturazione con i piretroidi a basso intervallo di carenza. Su tutte le altre specie e varietà incominciare almeno 30 – 35 gg prima della raccolta con prodotti endoterapici e in seguito con prodotti di contatto e con un intervallo non superiore ai 5 – 6 gg. . L'uso di trappole di cattura Massale e di esche proteiche avvelenate aiuta ad abbassare la popolazione del fitofago. Controllare attentamente su etichette aggiornate gli utilizzi consentiti, il numero trattamenti e i giorni di carenza.



Pomodoro da pieno campo e da industria

Fase fenologica: Maturazione - pre raccolta

Tignola del pomodoro

(*Tuta absoluta*): tuta si consiglia di intervenire esclusivamente con bacillus thuringiensis, da alternare a prodotti sia di sintesi che biologici altamente selettivi nei confronti dei miridi che risultano determinanti nella lotta al fitofago.