

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



Notiziario fitosanitario

N. 627/ATO8/2025

Valido dal 16/09 al 26/09/2025

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo **cellulare**
www.sardegnaagricoltura.it Info sul web

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla

Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 60268007

Consigli culturali e difesa



Vite

Fase fenologica: Maturazione - Grappoli maturi **scalaPFP -- scalaBBCH 89**

Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*): le catture sono in netta diminuzione e inoltre si è registrata la quarta generazione solo nell'areale costiero del SUT e solo su Lobesia. Si consiglia di effettuare controlli a campione sui grappoli per verificare la presenza di uova o larve solo su varietà tardive come Nuragus, Cannonau, Cabernet, Montepulciano e su varietà particolarmente sensibili al fitofago.

Cocciniglia della vite (*Planococcus ficus*): nei vigneti in cui si sono verificati forti attacchi del fitofago si consiglia di effettuare, dopo la vendemmia, un trattamento con olio minerale bianco estivo al 2%, provvedendo a bagnare abbondantemente la chioma. Lo scopo di questo intervento è d'intercettare la discesa delle cocciniglie prima che si riparino sotto il ritidoma.



Olivo

Fase fenologica: 2^a Fase accrescimento dei frutti **scalaPFP -- scalaBBCH 77-79**

Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): dal controllo delle drupe si riscontra un aumento delle ovodeposizioni. Si consiglia di monitorare costantemente le drupe e verificare le soglie d'intervento soprattutto sulle varietà altamente sensibili e su le olive destinate alla mensa. Le soglie sono del 2-3% di olive con punture fertili per quelle da mensa e varietà particolarmente sensibili e del 12-15% per quelle da olio. Se si rendesse necessario eseguire un trattamento antiparassitario è preferibile utilizzare inizialmente prodotti endoterapici e larvicidi e in seguito adulticidi di contatto. Sulle varietà più sensibili e da salamoia, le due tipologie si possono essere abbinate. L'uso di Caolino e Zeolite, oltre ad abbassare la temperatura della vegetazione, esplica un'azione repellente nei confronti degli adulti della Mosca Olearia. Su varietà tardive da olio si può abbinare all'insetticida un prodotto a base di rame che oltre all'azione anticrittogamica, ha anche un'azione secondaria repellente sulla mosca.



Agrumi

Fase fenologica: Ingrossamento frutti (agrumi)

Cocciniglia rossa forte degli agrumi (Aonidiella aurantii): dal controllo delle trappole a feromoni risulta la presenza di una nuova generazione della cocciniglia. Si consiglia d'intervenire al più presto con un insetticida anticoccidico abbinato possibilmente all'olio minerale bianco estivo. Su Clementine a maturazione precoci utilizzare prodotti registrati anche sulla Ceratitis Capitata.

Pesco

Fase fenologica: maturazione di raccolta (drupacee)

Mosca della frutta (Ceratitis capitata): la pressione dell'insetto è sempre elevatissima su tutti i fruttiferi, compreso il melograno e tutte le varietà di drupacee e pomacee tardive. Controllare attentamente sulle etichette aggiornate gli utilizzi consentiti, il numero trattamenti e i giorni di carenza. L'uso di esche proteiche avvelenate aiuta ad abbassare la popolazione del fitofago.

