

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



Notiziario fitosanitario

N. 526/ATO8/2024

Valido dal 16/10 al 24/10/2024

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo cellulare
www.sardegnaagricoltura.it Info sul web

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla

Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 60268007

Consigli culturali e difesa



Vite

Fase fenologica: Maturazione - Grappoli maturi [scalaPFP](#) -- [scalaBBCH 89](#)

Cicaline della vite (Cicalina verde: *Empoasca vitis*) – (Cicalina africana: *Jacobiasca lybica*): si consiglia di effettuare i monitoraggi ed intervenire solo quando si supera la soglia di 1-1,5 neanidi per foglia. E' importante che queste ultime, in questo periodo, abbiano una sufficiente superficie fotosintetizzante. Le piante in questa fase accumulano le sostanze di riserva che sono essenziali per la parte iniziale della prossima stagione (compresa la fioritura).

Sempre in un'ottica di ottimizzazione dell'accumulo di sostanze di riserva, è utile in questo periodo somministrare 20-25 unità d'azoto per Ha.



Olivo

Fase fenologica: Inizio Invaiaura [scalaPFP](#) -- [scalaBBCH](#) --

Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): dal controllo delle trappole a feromone risulta un aumento delle catture settimanali. Effettuare i monitoraggi sulle drupe e intervenire al superamento delle soglie d'intervento (10-15% di olive con uova e larve vive per quelle da olio, 2-3% su olive da mensa) solo su varietà a maturazione medio tardiva. Su quelle precoci è bene raccogliere al più presto, soprattutto se si considera che la migliore qualità dell'olio si ottiene negli Oliveti dove sul 50% dei frutti si è raggiunto il 50% dell'invaiaura. Sempre in un'ottica di maggiore qualità e bene utilizzare cassette specifiche con i fori di areazione per evitare il più possibile il surriscaldamento delle olive. Quest'ultime vanno conferite al più presto (24-48 ore) presso gli impianti di molitura, soprattutto se si utilizzano abbacchiatori per la raccolta.



Agrumi

Fase fenologica: Invaiaitura

Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*): in questo momento le catture sono in ulteriore forte aumento. Risulta necessario trattare sulle varietà molto e mediamente precoci di Clementine e Arancio. Si possono utilizzare prodotti endoterapici da alternare con esche proteiche avvelenate registrate sulle colture. L'uso di trappole di cattura massale può abbassare la popolazione del fitofago. Sulle varietà a maturazione media e tardiva la presenza massiccia degli oli essenziali sulla buccia protegge i frutti dall'attacco dell'insetto.