

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



Notiziario fitosanitario

N. 663/ATO8/2026

Valido dal 18/02 al 26/02/2026

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo **cellulare**
www.sardegnaagricoltura.it Info sul web

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla

Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 60268007

Consigli culturali e difesa



Vite

Fase fenologica: Gemma in riposo invernale **scalaPFP A** **scalaBBCH 00**

Mal dell'esca (vari funghi tra cui Fomitiporia mediterranea, Phaemoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum): il complesso di crittogame che causano la malattia penetra all'interno della pianta attraverso le ferite di potatura. Più queste sono ampie e più è facile che i funghi riescano a instaurarsi. Al momento si può intervenire esclusivamente in modo preventivo sia con funghi antagonisti come i Trycoderma oppure con alcune sostanze di sintesi capaci di colonizzare e disinfettare i tagli di potatura. Entrambi vanno somministrati possibilmente a gemma dormiente e non oltre le due settimane dalla fine della potatura. In ogni caso leggere attentamente le indicazioni in etichetta. Evitare il più possibile i tagli di ritorno su legno vecchio di 3 anni. Non tagliare a raso, ma lasciare una porzione di legno (legno di rispetto) che evita al secco di penetrare direttamente all'interno delle branche principali.



Olivo

Fase fenologica: Riposo vegetativo **scalaPFP 1 (A)** **scalaBBCH 00**

Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina): è crittogame in genere: dopo gli interventi di potatura si consiglia, per chi non avesse ancora provveduto, di effettuare i trattamenti invernali anticrittogamici. Intervenire al più presto con prodotti di contatto quali: sali di Rame, zolfi bagnabili, Fosfonati di Potassio, bacillus ecc. Riservare, possibilmente, i prodotti endoterapici di sintesi dal periodo di prefioritura in poi. Controllare attentamente in etichetta le registrazioni sulla coltura e le modalità d'uso dei prodotti.

Pesco

Fase fenologica: Gemma in riposo invernale

Bolla del pesco (*Taphrina deformans*): Si consiglia d'intervenire al più presto su tutti i fruttiferi in riposo vegetativo contro crittogame come Bolla, Corineo, Monilia, Ticchiolatura ecc.ecc . Si possono utilizzare sia prodotti di contatto che endoterapici. Evitare di effettuare trattamenti sulle specie e varietà già in fioritura come per esempio diverse varietà di mandorlo. Per ogni evenienza controllare in etichetta le registrazioni, il periodo d'intervento consigliato, i tempi di carenza ecc.



Agrumi

Fase fenologica: Maturazione

Allupatura (*Phytophthora* spp.): Le piogge persistenti di quest'ultimo periodo hanno favorito il diffondersi di marciumi dovuti ad agenti fungini come *Phytophthora* spp., che provocano la cosiddetta "allupatura" dei frutti e dei *Penicillium* spp. che provocano i marciumi verdi e azzurri sempre dei frutti. Si consiglia di creare, dove le condizioni lo permettono, dei canali di scolo che riescano ad eliminare l'eccesso di umidità nei terreni e di procedere il più in fretta possibile alla raccolta dei frutti.