

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



Notiziario fitosanitario

N. 547/ATO8/2024

Valido dal 20/12 al 15/01/2025

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo cellulare
www.sardegnaagricoltura.it Info sul web

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla

Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 60268007

Consigli culturali e difesa



Vite

Fase fenologica: Gemma in riposo invernale

:per quanto riguarda concimazione invernale, si consiglia d'intervenire con un concime ternario a basso titolo di azoto provvisto anche di una componente organica. Si possono utilizzare anche i classici ternari come 11-22-16 o 12-12-17 abbinandoli a un concime a base organica come i superstallatici pellettati (3-6 qli.) E' sempre auspicabile l'uso dei letami maturi o dei compost. Nei vigneti irrigui distribuire 3-4 qli ad Ha di ternario in una sola somministrazione invernale, oppure dividere i due il quantitativo, metà in inverno e il resto in primavera. Nei vigneti non irrigui intervenire solo all'inizio dell'inverno con massimo 2-2,5 qli ad Ha. I letami e i compost vanno distribuiti il più presto possibile.



Olivo

Fase fenologica: Riposo vegetativo

:per quanto riguarda la concimazione invernale, si consiglia d'intervenire con un concime ternario a basso titolo di azoto provvisto anche di una componente organica. Si possono utilizzare anche i classici ternari come 11-22-16 o 12-12-17 abbinandoli a un concime a base organica come i superstallatici pellettati (3-6 qli). E' sempre auspicabile l'uso dei letami maturi o dei compost. Negli oliveti irrigui distribuire 3-4 qli ad Ha di ternario in una sola somministrazione invernale, oppure dividere in due il quantitativo, metà in inverno e il resto in primavera. Negli oliveti non irrigui intervenire solo all'inizio dell'inverno con massimo 2-2,5 qli ad Ha. I letami e i compost vanno distribuiti il più presto possibile.

Pesco

Fase fenologica: caduta foglie (drupacee)

:su tutti i fruttiferi, si consiglia d'intervenire con un concime ternario a basso titolo di azoto provvisto anche di una componente organica. Si possono utilizzare anche i classici ternari come 11-22-16 o 12-12-17 abbinandoli a un concime a base organica come i superstallatici pellettati (3-6 qli) . E' sempre auspicabile l'uso dei letami maturi o dei compost. Nei Frutteti distribuire 5-7 qli ad Ha di ternario in una sola somministrazione invernale, oppure dividere in due il quantitativo, metà in inverno e il resto in primavera. I letami e i compost vanno distribuiti il più presto possibile.

Agrumi

Fase fenologica: Gemme dormienti (agrumi)

:per quanto riguarda la concimazione invernale, si consiglia d'intervenire con un concime ternario a basso titolo di azoto provvisto anche di una componente organica. Si possono utilizzare anche i classici ternari come 11-22-16 o 12-12-17 abbinandoli a un concime a base organica come i superstallatici pellettati(3-6 qli). Negli agrumeti distribuire 6-8 qli ad Ha di ternario frazionandoli in 2-3 somministrazioni a partire dal tardo autunno e finendo nella tarda primavera.