

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



Notiziario fitosanitario

N. 673/ATO8/2026

Valido dal 22/04 al 01/05/2026

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo cellulare
www.sardegnaagricoltura.it Info sul web

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla

Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 60268007

Consigli culturali e difesa



Vite

Fase fenologica: Grappoli separati **scalaPFP G scalaBBCH 55**

Oidio o Mal Bianco (Erisiphe (=Uncinula) necator): l'arrivo dell'alta pressione africana dovrebbe garantire una settimana senza precipitazioni. Utilizzare gli zolfi micronizzati e bagnabili, in alternativa o in abbinamento si possono utilizzare prodotti di origine biologica a base di bacilli antagonisti, oli essenziali d' Arancio e principi attivi di sintesi appartenenti alle famiglie delle Spiroketal amine, Strobilurine e Triazoli. In caso di abbinamento verificare in etichetta le diverse compatibilità fra i vari principi attivi.

Peronospora (Plasmopara viticola): considerando che le temperature massime per i prossimi 7-8 gg saranno tra i 21° e 24° e perciò ideali, che la settimana scorsa si sono verificate piogge infettanti e che sono possibili delle piogge nei primi giorni di Maggio, si consiglia d'intervenire con prodotti di copertura e prodotti endoterapici altamente sistemici in grado di seguire e difendere la vegetazione in rapido accrescimento.



Olivo

Fase fenologica: Mignolatura **scalaPFP 3 (C) scalaBBCH 53-59**

Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina): si può intervenire con prodotti a base Rame solo negli impianti in ritardo e perciò non prossimi alla fioritura. Negli Oliveti allo stadio di mignolatura si possono utilizzare prodotti a base di bacilli, zolfi bagnabili e anticrittogamici endoterapici che sono in grado penetrare all'interno dei tessuti. Per alcuni di quest'ultimi è previsto l'utilizzo solo in questa fase fenologica. Nelle zone più precoci, quelle in prossimità della costa, si è già in alcuni impianti in piena fioritura. In quest'ultimi evitare qualsiasi trattamento sino alla totale conclusione della stessa. In ogni caso leggere attentamente in etichetta i dosaggi, le autorizzazioni, il numero di interventi autorizzati e i periodi di utilizzo consentiti.



Agrumi

Fase fenologica: Fioritura

:evitare qualsiasi trattamento che possa interferire con l'attività degli insetti impollinatori. Benchè molte specie e varietà di Agrumi siano autofertili, il passaggio degli insetti pronubi garantisce sempre una migliore qualità dei frutti.

Pesco

Fase fenologica: caduta petali (pesco)

Bolla del pesco (Taphrina deformans):si riscontrano attacchi da parte del fungo soprattutto su Pesco, ma la crittogama è in grado di attaccare anche le altre drupacee. Si consiglia d'intervenire con prodotti di contatto che endoterapici(sistemici, citotropici e translaminari). Molti principi attivi ammessi per la bolla hanno un'azione collaterale contro diverse crittogame che attaccano i fruttiferi. In ogni caso leggere attentamente in etichetta i dosaggi, le autorizzazioni, il numero di interventi autorizzati e i periodi di utilizzo consentiti.