

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



Notiziario fitosanitario

N. 670/ATO8/2026

Valido dal 07/04 al 13/04/2026

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo cellulare
www.sardegnaagricoltura.it Info sul web

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla

Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 60268007

Consigli culturali e difesa



Vite

Fase fenologica: Foglie distese [scalaPFP E](#) [scalaBBCH 11-19](#)

Oidio o Mal Bianco (Erisiphe (=Uncinula) necator): se negli anni precedenti si sono verificati forti attacchi da parte della crittogama e soprattutto non si è intervenuti dopo la vendemmia, si consiglia di agire al più presto con zolfi micronizzati se le temperature superano i 17°-18° oppure in polvere se le temperature superano i 19°-20°. In alternativa si possono utilizzare prodotti di origine biologica a base di bacilli antagonisti, oli essenziali e principi attivi di sintesi come Strobilurine e meptildinocap (si ricorda che per quest'ultimo si possono smaltire eventuali scorte entro il 30/09/2026). Tutti questi risultano attivi anche a basse temperature. Controllare attentamente le previsioni del tempo poiché essendo tutti prodotti di contatto sono facilmente dilavabili da precipitazioni di 15 - 20 mm. Per quanto riguarda eventuali danni, su varietà precoci, dovuti a abbassamenti di temperature accompagnati anche da venti sostenuti, può risultare utile l'uso di biostimolanti per via fogliare che aiutano la vegetazione superare il momento critico.



Olivo

Fase fenologica: Formazione dei grappoli fiorali [scalaPFP --](#) [scalaBBCH 51](#)

Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina): si consiglia (soprattutto negli oliveti in cui nella passata stagione si sono verificati forti attacchi) d'intervenire o con i classici fitofarmaci a base di rame, o con prodotti a base di zolfi bagnabili, o con agrofarmaci a base di bacilli. Riservare gli endoterapici, in grado di penetrare all'interno dei tessuti, al periodo di prefioritura, sia per prevenire eventuali problemi di fitotossicità e sia per rispettare le indicazioni di alcuni principi attivi che prevedono l'utilizzo solo in questa fase fenologica. Ricordarsi che sia i prodotti di contatto che gli endoterapici, oltre all'occhio di pavone indicato in etichetta, hanno normalmente un'azione collaterale verso altre crittogame che attaccano l'Olivo come Lebbra e la Piombatura. I sali di rame hanno un tetto massimo di 28Kg in 7 anni perciò una media di 4 Kg all'anno di principio attivo. In ogni caso leggere attentamente in etichetta i dosaggi, le autorizzazioni, il numero di interventi autorizzati e i periodi di utilizzo consentiti.



Agrumi

Fase fenologica: Bottoni fiorali (agrumi)

:Su specie e varietà già raccolte si può procedere con una concimazione azotata con dosaggi di 25-35 unità ad Ha.

Pesco

Fase fenologica: Fioritura

Bolla del pesco (*Taphrina deformans*):Intervenire con principi attivi sia di contatto che endoterapici. Molti principi attivi ammessi per la bolla hanno un 'azione collaterale contro diverse crittogame che attaccano i fruttiferi. Si ricorda che assolutamente vietato l'uso di insetticidi e acaricidi durante la fioritura. In ogni caso leggere attentamente in etichetta i dosaggi, le autorizzazioni, il numero di interventi autorizzati e i periodi di utilizzo consentiti.

