Laore
Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura
Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura

Notiziario fitosanitario

N. 571/ATO8/2025
Valido dal 09/05 al 19/05/2025

Servizio SMS avvisi su infestazioni e trattamenti direttamente sul tuo cellulare
www.sardegnaagricoltura.it Info sui web

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla

Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 60268007

Consigli colturali e difesa

Vite

Fase fenologica: Inizio Fioritura scalaPFP -- scalaBBCH --

Oidio o Mal Bianco (Erisiphe (=Uncinula) necator):le previsioni meteo per la prossima settimana danno condizioni variabili con possibilità di scrosci di pioggia e temperature massime intorno ai 22°-24°. Utilizzare gli zolfi micronizzati e bagnabili, in alternativa o in abbinamento si possono utilizzare prodotti di origine biologica a base di bacilli antagonisti, oli essenziali e principi attivi di sintesi come Strobilurine e Triazoli. In caso di abbinamento verificare in etichetta le diverse compatibilità fra i vari principi attivi.

Peronospora (Plasmopara viticola):si stanno verificando attacchi da parte della crittogama sia sulle foglie che sui grappoli. Considerando che le previsioni meteo per la prossima settimana danno condizioni ideali per un infezione di tipo primario, si consiglia d intervenire al più presto abbinando principi attivi di copertura con endoterapici ad alta sistemia. Quest'ultimi sono in grado di seguire l'accrescimento dei germogli e conseguentemente difendere anche la nuova vegetazione. In situazioni di pressione elevata da parte del fungo si consiglia di tenere una copertura continua sulla vegetazionedi e di trattare ogni 7 -8 giorni

Olivo

Fase fenologica: Inizio fioritura

:nelle zone più interne del territorio si è a inizio fioritura, mentre nelle zone più precoci vicino alla costa si è già in piena fioritura. In ogni caso evitare qualsiasi trattamento sino alla totale conclusione della stessa.

Pesco

Fase fenologica: Frutto noce (pesco)

Afide verde pesco (Myzus persicae):dall'attività di monitoraggio si riscontra la presenza sia dell'afide farinoso che del classico afide verde del pesco che provoca l'arricciamento delle foglie. Sul primo si può intervenire in maniera localizzata mentre per il secondo è necessario effettuare il trattamento su tutte le piante a causa della sua velocità nel colonizzare tutta la vegetazione. In ogni caso su tutti i fruttiferi attaccati si consiglia di utilizzare esclusivamente prodotti endoterapici in grado di attraversare lo spessore delle foglie e raggiungere la pagina inferiore delle stesse. Vi ricordo che è vietato l'uso di qualsiasi insetticida durante la fase fenologica della fioritura.

Agrumi

Fase fenologica: Allegagione

Afidi agrumi (Aphis spiraecola citricola; Aphis gossypi; Toxoptera aurantii):spesso insetti predatori e parassitoidi riescono in qualche settimana ad eliminare l'infestazione. Se quest'ultimi non riescono a tenere almeno sotto controllo la popolazione, si può intervenire con appositi detergenti a base potassica registrati per l'uso in agricoltura e in alternativa utilizzare acidi grassi di sali potassici. Questi prodotti risultano molto efficaci nei confronti di questi fitofagi e se utilizzati secondo le istruzioni in etichetta, risultano selettivi nei confronti dei predatori naturali, degli insetti impollinatori e in generale degli artropodi utili.