

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



Notiziario fitosanitario

N. 645/ATO8/2025

Valido dal 13/11 al 24/11/2025

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo cellulare
www.sardegnaagricoltura.it Info sul web

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla

Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 60268007

Consigli culturali e difesa



Agrumi

Fase fenologica: Invaiatura

Mosca della frutta (Ceratitis capitata): il numero di catture nelle trappole di monitoraggio è in aumento. Si ricorda che gli agrumi perdono progressivamente la resistenza alle punture della mosca a partire dall'invaiatura. Su varietà di clementine a maturazione medio precoce si consiglia di utilizzare solo prodotti di contatto a breve intervallo di sicurezza. Su specie e varietà più tardive, se non si è già provveduto ad effettuare i trattamenti, utilizzare sia prodotti endoterapici che di contatto abbinati all'olio minerale Bianco. Controllare attentamente in etichetta i dosaggi, le varie registrazioni, le compatibilità e i tempi di carenza. L'uso di trappole di cattura massale e di esche proteiche avvelenate aiuta ad abbassare la popolazione del fitofago.



Olivo

Fase fenologica: Invaiatura **scalaPFP 7 (G)** **scalaBBCH 81**

Mosca dell'olivo (Bactrocera oleae): le catture nelle stazioni monitoraggio risultano quasi nulle. Considerando che si è verificato un anticipo di maturazione di 7 – 10 gg su tutte le varietà, si è ormai in fase di raccolta tutte le varietà medio precoci e fra poco ci si appresta a iniziare anche le più tardive. Vi ricordo che il momento migliore per la raccolta è quando sul 50% delle olive si ha il 50% della superficie invaiata. Utilizzare per la raccolta le apposite cassette traforate e conferire ai frantoi le olive non oltre le 48 ore dalla raccolta. Se si usano abbacchiatori non oltre le 24 ore.

